


De mest aktuelle lusfluene i Norge

(Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet)

For fullstendig tabell se:

Anderson, H. 1985. De svenska lusflugorna. Ent. Tidsskr. 106: 15-25.


- Med avbrutte vinger
 - *Lipoptena cervi*, Hjortelusflue (2 D)
- Med forkrympete vinger (1 H)
 - *Crataerina pallida*, Tårnseilerlusflue (kun på tårnseiler)
 - *Crataerina hirundinis*, Svalelusflue (kun på taksvale)
- Med fullt utviklete vinger (2 B,C)
 - *Ornithomyia*, fuglelusfluer
 - Med sluttet analfelt (2 B, an)
 - *O. avicularia*, Stor fuglelusflue, Sør-Norge
 - Vingelengde 5,5 – 6,6 mm (mange fuglearter)
 - *O. chloropus*, Vanlig fuglelusflue, Hele Norge
 - Vingelengde under 5,5 mm (mange fuglearter)
 - Uten sluttet analfelt (2 C)
 - *Lipoptena cervi*, Hjortelusflue (hjortedyr, tilfeldig på andre dyr)




Tårnseglerlusflue,
Crataerina pallida



Ornithomyia chloropus




Fuglelusfluer,
Ornithomyia sp.



Hjortelusflue m/ vinger
Lipoptena cervi

Lipoptena cervi



2



Hjortelusflue u/ vinger,
men med avkortede rester

