Fugleinfluensa

Kjenn igjen tegnene og varsle tidlig

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en alvorlig og svært smittsom virussykdom som kan utvikle seg raskt. Plutselig økt dødelighet kan være det første og eneste tydelige tegnet på sykdommen

Fjørfeholdere bør være særlig oppmerksomme på følgende tegn

Plutselig økt dødelighet

Flere døde fugler enn vanlig eller brå økning i dødelighet, også når økningen er liten i antall individer

Blålig kam og hakelapper

Kammen eller hakelappene kan bli mørkere eller få en blålig farge

Blødninger på beina

Rødlige eller mørke blødninger i underhuden på beina

Hovne hoder

Hevelser i hoderegionen. Rennende øyne eller væske fra nebbet kan også forekomme

Sturing og redusert aktivitet

Fuglene virker slappe eller nedstemte, trekker seg unna, beveger seg mindre eller reagerer mindre enn vanlig

Endret lyd og andre tegn

Redusert eller totalt fravær av kakling/galing. Redusert fôr- og vanninntak, fall i eggproduksjonen og pustevansker



Blålig kam



Hevelser i hoderegionen



Underhudsblødninger på beina

Ved mistanke om fugleinfluensa

Ring Mattilsynet straks på 22 40 00 00

Ikke flytt fugler, egg, gjødsel eller utstyr ut av anlegget. Begrens ferdsel inn og ut, og unngå kontakt med andre fuglehold.

Veterinærinstituttet

Mattilsynet