



Mattilsynet
Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL

Ullevålsveien 68
Postboks 750 Sentrum - 0106 Oslo
Sentralbord 23 21 60 00 - Faks 23 21 60 01
Post mottak@vetinst.no

Ref: 2018/113104

Vår ref: 18/14715-2

Dato 3.7. 2018

Høring nr 3, 2018. Forslag til endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften


Blant endringene i fôrtilsetningsstoff-forskriften som høringen gjelder, er regodkjenning av kobberforbindelser i fôr til diverse produksjonsdyr. Veterinærinstituttet synes det er beklagelig at EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, mat og fôr (SCPAFF), seksjon fôrvarer, ikke har klart å redusere maksimalt kobberinnhold i fôr til smågris mer enn de nå har gjort. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) viste i sin vurdering i 2014 til at behovet for kobber i fôr til smågris er rundt 5-6 mg/kg, og anbefalte en reduksjon. Det samme gjorde EFSA i 2016. Veterinærinstituttet har skrevet brev til Mattilsynet i 2014 og 2017 om nødvendigheten av å redusere kobber i dyrefôr, hovedsakelig begrunnet ut fra risiko for bakteriell resistens mot kobber, som også synes å være koblet til resistens mot enkelte antibiotika. Veterinærinstituttets brev har også blitt forelagt SCPAFF. Fagmiljøene som er representert i VKM, EFSA og Veterinærinstituttet har i denne saken alle påpekt at kobber bør brukes for at dyra skal opprettholde normal helse, velferd og produksjon. Men at man bør unngå høyere konsentrasjonen som brukes for å kurere eller forebygge produksjonssykdommer rundt avvenning av grisunger fra mora.

Det nye maksimale kobberinnholdet i smågrislefôr innebærer kun en liten reduksjon fra dagens maksimale innhold på 170 mg/kg til 150 mg/kg, og følger i stor grad ønsket fra EUs fôrindustri (FEFAC, 2017) som ikke har tatt hensyn til risikoen unødvendig høye kobberkonsentrasjoner i fôret innebærer - spesielt for utvikling av bakteriell resistens.


Da EØS-avtalen har gitt Norge unntak for EUs maksimale innhold av kobber i fôr til smågris, vil vi fortsatt ha et maksimalt kobberinnhold i Norge på 35 mg/kg i smågrislefôr og er således bedre stilt enn EU. Men etter Veterinærinstituttets mening er også dette unødvendig høy maksimalgrense.

Veterinærinstituttet tar de øvrige endringene i høringen til orientering og har ingen innspill.

Med vennlig hilsen



Merete Hofshagen
avdelingsdirektør



Aksel Bernhoft
ansvarlig for fôrtrygghet

Referanser:

EFSA 2016. Revision of the currently authorised maximum copper content in complete feed. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed /FEEDAP). EFSA J 14(8):4563.

FEFAC 2017. FEFAC proposal for a reduction of copper levels in feed with minimum impact on piglets welfare livestock performance and need for medication. Letter 2.1.2017.

Norwegian Veterinary Institute 2014. Zinc, copper and iodine in feed for terrestrial livestock animals - Evaluation of change in maximum levels. Letter to the Norwegian Food Safety Authority, 11. November 2014, ref. 14/56371.

Norwegian Veterinary Institute 2017. Copper in animal feed and risk for bacterial resistance towards copper and antibiotics. Letter to the Norwegian Food Safety Authority, 19. April 2017, ref. 17/21377.

VKM 2014. Zinc and copper in pig and poultry production - fate and effects in the food chain and the environment. Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 13-603, 128 pp.